## XYLAZINA 10%

SEDANTE MIORRELAJANTE Y ANALGESICO PARA EQUINOS

Uso en Medicina Veterinaria



FORMULA: Cada ml. contienen:

Xylazina (como clorhidrato)

100 mg. Excipientes c.s.p. 1 ml.

INDICACIONES DE USO: Xylazina 10% está indicado en los siguientes casos:

- Procedimientos diagnósticos: examen oftálmico o bucal, palpación abdominal o rectal, examen vaginal, colocación de sonda vesical o nasogástrica, rayos X.
- Maniobras clínicas: desvasado, herrado, etc.
- Cirugías menores con necesidad solo de sedación y analgesia menor, heridas, suturas con la asociación de anestesia local, etc.
- Preanestésicos o como complemento de cirugías locales.

VIA y FORMAS DE ADMINISTRACIÓN O APLICACIÓN: Inyectable: Endovenoso o Intramuscular.

## DOSIFICACION:

Sedación:

EV: 0,5 ml/50 kg de peso (1 a 1,1 mg/kg.)

IM: 1 ml/50 kg de peso (2 a 2,2 mg/kg.)

Luego de administración de Xylazina 10% el equino debe ser mantenido en un ambiente tranquilo hasta lograr el efecto máximo de sedación.

La administración de la dosis indicada produce sedación por un período de 1 a 2 horas con analgesia durante los primeros 15 a 30 minutos.

COMPLEMENTO DE ANESTESIA LOCAL: Se utiliza a las mismas dosis indicadas para sedación en conjunción con lidocaina localmente.

PREANESTESICO: Se utiliza a las mismas dosis que en la sedación. Debido al efecto aditivo de depresión del sistema nervioso central solo debe administrarse 1/2 a 1/3 de la dosis de barbitúricos para lograr un plano de anestesia quirúrgica.

INTERVALO ENTRE DOSIS: De ser necesario se puede repetir la dosificación en forma total o parcial según el criterio del médico veterinario. Se recomienda como dosis de repetición: EV: 0,25 ml/50 kg. (0,5 mg/kg.)

EFECTOS COLATERALES POSIBLES (locales y/o generales) INCOMPATIBILIDAD Y ANTAGONISMOS FARMACOLÓGICOS: A las dosis recomendadas pueden observarse ligeros temblores musculares, bridicardia con bloqueo parcial atrio-ventricular y disminución de la frecuencia respiratoria. Todos estos efectos colaterales revierten espontáneamente luego de pasado el efecto de sedación.

PRECAUCIONES: Debido al efecto depresor sobre el sistema nervioso central, deben extremarse las precauciones en el caso de su utilización en animales con severa depresión respiratoria, insuficiencia cardiaca o estado de shock profundo. No debe administrarse por vía intracarotidea. Cuando se utiliza la vía endovenosa extremar las precauciones para una aplicación por yugular.

INTOXICACIÓN Y SOBREDOSIS EN LOS ANIMALES: La dosis recomendada no produce intoxicación o sobredosis alguna.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-3330160

## VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA.



NO ARROJE EL ENVASE AL CAMPO DESPUES DE UTILIZARLO

Conservar entre 5° y 25° C.

PRO SER S.A.

Av. L. N. Alem 1698 (2752) Capitán Sarmiento. Bs. As. Tel/Fax: 02478 482373 proser@labproser.com.ar www.labproser.com.ar

Director Técnico: Dr. Ricardo I. Vedoya Médico Veterinario (Matrícula N°2924)



Certificado Nº: 98220 Establecimiento Elab. N°5648